

**Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Adictivas  
en la República Argentina**

Subsecretaría Nacional de Prevención del

Uso indebido de Drogas.

Resultados Generales

Hugo A. Miguez

*(Investigador del Conicet a cargo de la elaboración del instrumento de  
recolección de datos,*

*el análisis y la redacción del informe final)*

Tomos que acompañan este resumen en el informe original publicado por la  
Secretaría Nacional:

**Tomo I** : Prevalencia en la población de 16 a 64 años.

**Tomo II** :Prevalencia en la población de 12 a 15 años.

**Tomo III** :Perfil del consumo en la población de 12 a 64 años.

**Tomo IV**:Síndrome de Dependencia, Abuso y Uso no experimental.

**Apéndice metodológico**

Introducción

Desde hace años se presenta en la Argentina una preocupación creciente por el problema del uso y abuso del alcohol y las drogas. Es extendida la impresión acerca de su incremento y su presencia es relacionada con diferentes sucesos sociales con grave impacto en la salud pública. Pese a esto la percepción se fundamentaba hasta ahora en información parcial que no permitía tener una perspectiva global de la situación.

El estudio abarca un amplio espectro de sustancias psicoactivas elaborado en consulta con diferentes especialistas del área de adicciones. Desde el alcohol, el tabaco y los medicamentos hasta el campo de las drogas ilegales han sido incluidos como material de indagación en relación con los hábitos de consumo. Para estos efectos se utilizó una encuesta elaborada con base en instrumentos epidemiológicos reconocidos por organismos internacionales especializados en la materia y validada a su vez para nuestro medio. El cuestionario resultante de este procedimiento fue aplicado a una muestra probabilística en diferentes ciudades del país.

El informe que se presenta tiene como objetivo ofrecer una gran sistematización de la base de datos generada por la encuesta, apoyando de una manera gráfica la lectura de los datos, a partir de la cual se puedan determinar las líneas programáticas en los campos de la prevención primaria, secundaria y terciaria. En este sentido, al igual que en otros estudios similares, el propósito es aportar a los niveles de decisión la información estadística más indispensable para el análisis de la situación nacional y la formulación y diseño de planes preventivos y asistenciales.

Esta primera parte del informe denominada como "Introducción e Información básica" ofrece una caracterización resumida del consumo por sustancia y , a la vez tiene el cometido de orientar y referir la lectura de los datos hacia los diferentes capítulos que componen el informe cada vez que se requiere un examen más minucioso de la información.

Los dos primeros capítulos examinan la prevalencia del uso de drogas sobre las muestras donde fue aplicado el estudio, la de 12 a 15 años y la de 16 a 64 años. Se presentó la distribución del consumo, en lapsos comparables a nivel regional, buscando facilitar una lectura que apunte a la identificación socio demográfica de los sectores más afectados por estos problemas. Por su naturaleza conforma un mapa global de la extensión y situación general de los problemas del consumo de alcohol y de drogas en el país..

El tercer capítulo individualiza el consumo de cada sustancia según aspectos específicos ligados a la iniciación, formas y frecuencias de consumo, trastornos y problemas vinculados. Aporta el perfil estadístico relacionado con la naturaleza del consumo de cada sustancia adictiva que fue hallado en el momento que se administró la encuesta.

El cuarto capítulo se realizó sobre la base de la construcción de dos índices: el relacionado con las situaciones de abuso o de consumo no experimental y el vinculado a manifestaciones que integran el síndrome de dependencia. Este punto tiene importancia especial para el planeamiento desde la prevención secundaria y terciaria. En el primer caso porque el conocimiento de la estadística del abuso, que no alcanza aún el nivel de la dependencia o la adicción, constituyen la materia prima para el diseño de estrategias como la detección precoz y la intervención temprana. En el segundo caso porque la medición de la dependencia, en términos de los grupos y magnitudes que se encuentran involucrados en ella, hace posible la revisión de prioridades y acciones en materia de rehabilitación.

El desarrollo de los aspectos metodológicos relativos tanto al diseño y validación del cuestionario como a la muestra, el trabajo de campo y el ingreso de datos, fueron incorporados como apéndice de este informe.

Para el proceso estadístico se optó por la aplicación de los conceptos de prevalencia e incidencia para los dos grupos seleccionados: la población de 12 a 15 años y la de 16 a 64 años.

Los conceptos de abuso que se aplican en el informe están definidos por su carácter operativo y se aplican en el caso de sustancias o grupo de sustancias que son de circulación legal. Esto incluye al alcohol, al tabaco, los medicamentos estimulantes, sedantes y opiáceos y anestésicos usados fuera de prescripción médica. Tanto éstos, como los grupos que incluyen exclusivamente sustancias ilícitas (donde se caracterizó el Uso no Experimental), fijan los límites a partir de un criterio de frecuencia que se especifica en cada caso.

La definición de dependencia se orienta por las pautas de la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud que considera la presencia de tres o más de las siguientes manifestaciones

1. Deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir la sustancia.
2. Disminución de la capacidad para controlar el consumo de la sustancia, unas veces para evitar el inicio del consumo, otras para poder terminarlo y otras para controlar la cantidad consumida, como se evidencia por : tomar la sustancia durante más tiempo del que se pretendía, o por un deseo persistente o por esfuerzos para reducir el consumo sin éxito.
3. Un cuadro fisiológico de abstinencia cuando se consume menos sustancia o cuando se termina el consumo, apareciendo el síndrome de abstinencia característico por la sustancia o uso de dicha sustancia ( o alguna parecida) con la intención de evitar los síntomas de abstinencia.
4. Evidencia de tolerancia a los efectos de la sustancia tales como una necesidad de aumentar significativamente las cantidades de la sustancia necesaria para conseguir la intoxicación o el efecto deseado, o una marcada disminución del efecto con el consumo de la misma cantidad de sustancia.
5. Preocupación por el consumo de la sustancia que se manifieste por el abandono de otras fuentes de placer o diversiones a favor del consumo de la sustancia; o en gran parte del tiempo empleado en obtener, tomar o recuperar los efectos de la sustancia.
6. Persistencia en el consumo de la sustancia a pesar de sus evidentes consecuencias perjudiciales, como se evidencia por el consumo continuado una vez que el individuo es consciente o era presumible que lo fuera con respecto a la naturaleza y amplitud del daño

El cuestionario utilizado en la encuesta tiene como fuente el instrumento de la Organización Mundial de la Salud conocido como Entrevista Diagnóstica internacional compuesta – CIDI - en su versión medular 2.1 de enero de 1997. Dicho instrumento se basa en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS (CIE-10) y toma en cuenta la clasificación de la Asociación de Psiquiatría Americana (DSM-IV). Para su utilización se consideraron los trabajos en español desarrollados por el Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que en su calidad de Centro Colaborador de OMS actúa como asesor técnico reconocido sobre las aplicaciones del CIDI.

Los resultados señalaron :

*El valor de sensibilidad para la dependencia de otras sustancias psicoactivas fue de 100% . El valor de especificidad para la dependencia de otras sustancias psicoactivas fue del 100%. Todos los ítem relacionados con la dependencia al alcohol han diferenciado perfectamente a los sujetos. Esto muestra que el cuestionario no solo tiene coherencia y precisión, sino también que es válido para los fines que ha sido elaborado. En la segunda muestra de casos obtenida para drogodependientes y su muestra control, las diferencias fueron absolutas.*

El universo de trabajo comprendió a la Población Nacional Urbana de la República Argentina, de ambos sexos. Los estudios fueron divididos en : Adolescentes (población entre 12 y 15 años) y Adultos (Población entre 16 y 64 años).

La aplicación del cuestionario se realizó del 5 al 31 de marzo de 1999. El tamaño de la muestra fue de 2.699 casos. Con un margen de error de +/- 1,92% estimado para un nivel de confianza del 95,5%. En la misma fecha se realizó la aplicación del cuestionario para menores de 12 a 15 años, diseñándose una muestra no probabilística, coincidental, con un margen de error de +/- 5,29% para un nivel de confianza del 95,5%.

Entre la población de Adultos la muestra fue probabilística domiciliaria y polietápica, con selección final del entrevistado de acuerdo a cuotas de sexo y edad distribuida según parámetros poblacionales. En el caso de los adolescentes y adultos jóvenes (entre 16 y 24 años) se realizaron entrevistas coincidentales respetando las características sociodemográficas de este segmento poblacional ajustándose a cuotas parametrizadas con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1991 (INDEC) .

La muestra permite analizar la información de acuerdo a cuatro estratos que se definen a continuación:

Estrato 1: Departamentos que contienen ciudades o aglomerados urbanos con más de 2.000.000 de habitantes (Conurbano y Capital Federal)

Estrato 2: Departamentos que contienen ciudades o aglomerados urbanos de 500.000 a 1.999.999 habitantes.

Estrato 3: Departamentos que contienen ciudades o aglomerados urbanos de 100.000 a 499.999 habitantes.

Estrato 4: Departamentos que contienen ciudades o aglomerados urbanos con menos de 99.000 habitantes.

Respondiendo a esta descripción se relevaron las siguientes ciudades:

Estrato 1: Capital Federal y Conurbano.

Estrato 2: Gran Córdoba, Gran Mendoza, Gran Rosario, Gran Tucumán, La Plata y Mar del Plata.

Estrato 3: Ciudad de Santa Fé, Río Cuarto, Ciudad de Salta, Ciudad de Jujuy, Ciudad de Formosa, Posadas (Misiones), San Nicolás (Prov. De Buenos Aires).

Estrato 4: San Rafael (Mendoza), Tandil (Buenos Aires), Olavaria (Buenos Aires), San Martín (Mendoza), Clorinda (Formosa), San Pedro (Jujuy), Orán (Salta), Güemes (Salta), Ischilín (Córdoba), Villa Constitución (Santa Fé).

La cantidad de casos para cada muestra y su error muestral por Estrato son los siguientes:

#### Adultos

Estrato	Casos	Margen de error estimado para un nivel de confianza del 95,5%
1	668	3,8%
2	861	3,4%
3	532	4,3%
4	638	3,9%
Total	2.699	1,9%

#### Adolescentes

Estrato	Casos	Margen de error estimado para un nivel de confianza del 95,5%
1	80	11,1%
2	103	9,8%
3	77	11,3%
4	96	10,2%

Total	356	5,2%
-------	-----	------

Las expansiones de la base de cálculo de la muestra toman como parámetro la distribución etaria de la población estudiada con los datos provenientes del Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 (INDEC) .

Edad	Población
12 a 15 años	2.593.666
16 a 24 años	4.694.370
25 a 34 años	4.518.423
35 a 49 años	5.772.871
50 a 64 años	4.156.432
Edad	Población
12 a 15 años	2.593.666
16 a 64 años	19.142.096

Previo a la salida a campo se hizo una encuesta piloto con el objeto de probar la aplicación del cuestionario. La prueba se realizó en Capital Federal, Gran Mendoza y Tucumán.

### **Prevalencia General para el grupo de 16 a 64 años**

#### **Prevalencia de vida en el consumo de sustancias adictivas.**

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Sustancia	Masc.	Fem.	Total	
			Abs	%
<b>Alcohol</b>	96,46	86,69	2467	<b>91,40</b>

<b>Tabaco</b>	76,02	58,63	1809	<b>67,02</b>
<b>TOTAL Drogas sociales</b>	81,02	79,74	2168	<b>80,36</b>
<b>Marihuana</b>	11,98	5,40	231	<b>8,57</b>
<b>Clorhidrato de cocaína</b>	5,82	1,69	99	<b>3,69</b>
<b>Sustancias inhalables</b>	2,33	1,34	49	<b>1,82</b>
<b>Alucinógenos</b>	2,78	0,45	42	<b>1,57</b>
<b>Pasta base</b>	1,45	0,36	24	<b>0,88</b>
<b>Opiáceos y anestésicos</b>	0,99	0,15	15	<b>0,55</b>
<b>Crack</b>	0,45	0,18	8	<b>0,31</b>
<b>TOTAL Drogas ilegales</b>	13,95	6,49	274	<b>10,09</b>
<b>Sedantes</b>	5,48	6,58	163	<b>6,05</b>
<b>Estimulantes</b>	3,87	1,90	77	<b>2,85</b>
<b>TOTAL Medicamentos con uso ilícito</b>	2,99	5,64	118	<b>4,36</b>

### Prevalencia del consumo de sustancias adictivas en los últimos 30 días.

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Sustancia	Masc.	Fem.	Total
-----------	-------	------	-------

			Abs.	%
<b>Alcohol</b>	78,89	54,42	1787	<b>66,22</b>
<b>Tabaco</b>	45,66	34,40	1075	<b>39,83</b>
<b>TOTAL Drogas sociales</b>	81,08	62,62	1958	<b>72,56</b>
<b>Marihuana</b>	3,61	0,90	60	<b>2,21</b>
<b>Clorhidrato de cocaína</b>	1,98	0,56	34	<b>1,25</b>
<b>Sustancias inhalables</b>	0,63	0,14	10	<b>0,38</b>
<b>Alucinógenos</b>	0,41		5	<b>0,20</b>
<b>Pasta base</b>	0,60	0,03	8	<b>0,30</b>
<b>Opiáceos y anestésicos</b>	0,29		4	<b>0,14</b>
<b>Crack</b>	0,30		4	<b>0,15</b>
<b>TOTAL Drogas ilegales</b>	4,59	1,36	79	<b>2,92</b>
<b>Sedantes</b>	1,63	1,34	40	<b>1,48</b>
<b>Estimulantes</b>	0,84	0,28	15	<b>0,55</b>
<b>TOTAL Medicamentos con uso ilícito</b>	1,10	1,32	33	<b>1,21</b>

**Prevalencia General para el grupo de 12 a 15 años**

**Consumo de sustancias psicoactivas en la vida según sexo.**



Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999

<b>Sustancia</b>	<b>Masculino</b>	<b>Femenino</b>	<b>Total</b>
Alcohol	69,21	57,00	<b>62,86</b>
Tabaco	31,03	23,93	<b>27,34</b>
<b>Total Drogas sociales</b>	<b>66,06</b>	<b>54,15</b>	<b>59,87</b>
Marihuana	1,76	3,57	<b>2,70</b>
Clorhidrato de cocaína	1,24		<b>0,59</b>
Inhalantes	2,28	1,49	<b>1,87</b>
Opiáceos y anestésicos	0,11		<b>0,05</b>
<b>Total Drogas ilegales</b>	<b>3,69</b>	<b>3,57</b>	<b>3,63</b>
Sedantes	1,44	5,05	<b>3,32</b>
Estimulantes	0,21		<b>0,10</b>
<b>Total Medicamentos con uso ilícito</b>	<b>1,30</b>	<b>3,80</b>	<b>2,60</b>

## Consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días según sexo.

Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999

Sustancia	Masculino	Femenino	Total
Alcohol	33,92	28,46	<b>31,08</b>
Tabaco	20,14	12,60	<b>16,22</b>
<b>Total Drogas sociales</b>	<b>39,92</b>	<b>30,87</b>	<b>35,21</b>
Marihuana	1,24	1,25	<b>1,24</b>
Clorhidrato de cocaína	1,10		<b>0,53</b>
Inhalantes	0,35	1,25	<b>0,82</b>
<b>Total Drogas ilegales</b>	<b>1,24</b>	<b>1,25</b>	<b>1,24</b>
Sedantes	0,32		<b>0,15</b>
<b>Total Medicamentos con uso ilícito</b>	<b>0,32</b>		<b>0,15</b>

### Consumo de Drogas sociales.

Las tablas generales que refieren el consumo de alcohol y tabaco, sin diferenciar cantidades, muestran la amplia extensión de su consumo en la sociedad argentina actual. El 80,36% de la población de 16 a 64 años las usó alguna vez en la vida y el 72,56% en los treinta días anteriores al momento de la encuesta. (ref. Cap.I). Cuando el lapso del consumo se extiende a toda la vida de la persona los resultados prácticamente se igualan entre hombres y mujeres. Sin embargo a la hora de examinarlo en un período acotado, como es el caso de los últimos 30 días, predomina el varón en el uso de drogas sociales.

### **Consumo de drogas sociales (bebida alcohólica y tabaco) en la vida**

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Masc.

Fem.

Total

81,02

79,74

80,36

## **Consumo de drogas sociales (bebida alcohólica y tabaco) en los últimos 30 días**

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Masc.

Fem.

Total

81,08

62,62

72,56

La prueba de bebidas alcohólicas se sitúa alrededor de un promedio de edad de 17 años. En el caso de los varones esta iniciación se produce a los 16 años (d =3,7) y en las mujeres a los 18 años (d = 5,4). La prevalencia de vida alcanza a 9 de cada diez personas entre los 16 y 64 años .

### **Consumo de alcohol según sexo.**

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Prevalencia	<b>Masc</b>	<b>Fem</b>	<b>Total</b>
30 días	78,89	54,42	<b>66,22</b>
De vida o global	96,46	86,69	<b>91,40</b>

Países con tradición vitivinícola como la Argentina, con fuerte influencia italiana y española, llevan a que los datos limitados a la prevalencia del consumo de bebida alcohólica sean una información de una relevancia menor en un medio donde las pautas culturales hacen de la ingesta de bebida un hecho muy extendido en la población. Para un examen que permita analizar su impacto dentro del campo de la salud es necesario remitirse a otros niveles de especificidad como el que constituyen las medidas sobre el abuso de la bebida alcohólica y la dependencia a la misma.

### **Abuso de bebidas alcohólicas**



Alcohol (30d)	5,54	12,95	5,59	10,32	5,27	3,80	4,72	0,79	5,82	6,61
---------------	------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------

### Abuso de alcohol en los últimos 30 días según nivel económico social.

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Abuso	NES		TOTAL
	bajo	medio y alto	
Alcohol(30d)	8,11	4,30	6,61

### Abuso de alcohol en los últimos 30 días según zona.

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Abuso	Zonas					Totales		
	Capital Federal	Conurbano	Interior de Provincia	Grandes Ciudades	Resto Interior	TOTAL	Buenos Aires Total	Interior Total
Alcohol (30d)	3,95	4,27	3,07	6,43	9,86	6,61	3,85	9,12

### Abuso de alcohol en los últimos 30 días según

#### Necesidades Básicas Insatisfechas.

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Abuso	NBI		TOTAL
	SI	NO	
Alcohol(30d)	10,88	5,78	6,61

### Síndrome de dependencia al alcohol

La presentación de manifestaciones del Síndrome de Dependencia Alcohólica que involucra al 4,31% de la población que bebió en el último año alcanza, en este caso, a un 6,67% de los varones y un 1,74 % de las mujeres. (En la población total de 16 a 64 años es de 3,72%) (ref. Cap IV). De manera similar a

las relaciones halladas con el abuso de bebida alcohólica el síndrome de dependencia alcohólica tiene relaciones de asociación con las variables vinculadas a una mayor vulnerabilidad social.

### Síndrome de dependencia al alcohol.

(Porcentaje sobre total de personas que bebieron en el último año)

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Dependencia	varon	mujer	TOTAL
Bebidas alcohólicas	6,67	1,74	4,31

### Síndrome de dependencia al alcohol según grupo etario.

(Porcentaje sobre total de personas que bebieron en el último año)

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Dependencia Bebidas alcohólicas	16-24	25-34	35-49	50-64	TOTAL
varon	10,35	7,07	5,72	2,94	6,67
mujer	3,36	2,04	0,71	0,75	1,74
TOTAL	6,97	4,65	3,35	1,89	4,31

### Síndrome de dependencia al alcohol según nivel de instrucción.

(Porcentaje sobre total de personas que bebieron en el último año)

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Depen- dencia Bebidas alcohólicas	sin instruc- cion	Prima- rio  incom- pleto	Prima-rio com-pleto	Secun- dario incom- pleto	Secun- dario com-pleto	Tercia- rio  Incom- pleto	Univer- sitario incom- pleto	Tercia-rio com-pleto	universi- tario com- pleto	Total
varon	10,02	14,05	9,60	8,66	3,95		4,00	4,56	2,87	6,67
mujer	9,80	3,06	0,38	4,81	0,80		1,11	0,32		1,74
TOTAL	9,88	9,65	5,46	6,74	2,44		2,78	1,48	1,76	4,31

## Síndrome de dependencia al alcohol según nivel económico social.

(Porcentaje sobre total de personas que bebieron en el último año)

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Dependencia Bebidas alcohólicas	bajo	medio	alto	TOTAL
varon	7,97	5,21	3,53	6,67
mujer	1,85	1,99	0,29	1,74
TOTAL	5,12	3,53	2,10	4,31

## Síndrome de dependencia al alcohol según zona.

(Porcentaje sobre total de personas que bebieron en el último año)

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Dependencia Bebidas alcohólicas	Capital Federal	Conurbano	Interior de Pcia	Grandes Ciudades	Resto Interior	TOTAL	BUENOS AIRES TOTAL	INTERIOR TOTAL
varon	5,65	5,73	4,99	8,46	7,59	6,67	5,48	7,78
mujer	1,10		2,09	1,75	2,82	1,74	0,87	2,56
TOTAL	3,29	3,03	3,60	5,05	5,36	4,31	3,26	5,29


Finalmente, si se considera la población de 16 a 64 años afectada por el uso de bebidas alcohólicas, en los 30 días anteriores a la encuesta, tanto por sus hábitos de abuso como por la dependencia al alcohol esto involucra al 8,41% . En el caso de los varones este porcentaje asciende al 14,86% y en las mujeres al 2,40%.

## Abuso y/o dependencia a la bebida alcohólica en los últimos 30 días

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Dependencia o Abuso	varón	mujer	TOTAL
Bebidas alcohólicas	14,86	2,40	8,41





El uso de drogas sociales, alguna vez en la vida, que incluye a la población del estudio de menor edad, entre los 12 y los 15 años, incluye al 59,87% de los mismos.(ref. cap.II) En los últimos 30 días al 35,21%.

### **Consumo de drogas sociales (bebida alcohólica y tabaco) en la vida**

Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999

Masc.	Fem.	Total
66,06	54,15	59,87

### **Consumo de drogas sociales (bebida alcohólica y tabaco) en los últimos 30 días**

Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999

Masc.	Fem.	Total
39,92	30,87	35,21

En estas edades el consumo (en cantidad) de bebidas alcohólicas de ambos sexos es similar y los referidos a los 30 días anteriores al momento de la encuesta se sitúan en un 33,92% para los varones y un 28,46% para las mujeres( Ref.Cap.II)

### **Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días**

Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999

<b>Sustancia</b>	<b>Masculino</b>	<b>Femenino</b>	<b>Total</b>
Alcohol	33,92	28,46	<b>31,08</b>

El uso de tabaco tiene una prevalencia menor a la de la bebida alcohólica aún cuando su uso en la vida se mantienen en el 67,02% para el grupo de 16 a 64 años y 39,83% para los últimos 30 días. El porcentaje de ex fumadores (más de un año de no fumar) alcanza el 22,81%. (ref. cap I).

La edad de iniciación para este grupo de edad se sitúa cercana a los 16 años, mientras que la que corresponde al período identificado como de mayor uso de tabaco lo hace cerca de los 28 años (ref.cap.III)

### **Edad de iniciación en el uso de tabaco**

Población de referencia: personas que han fumado alguna vez.

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

<b>Edad</b>	<b>Porcentaje</b>
Menos de 13	9,1
13-15	37,0
16-18	34,8
19-21	9,9
22-29	6,2
30 y más	2,8
<b>Valor medio</b>	<b>16,7</b>
<b>desvío</b>	<b>4,8</b>

### **Edad del período en que más fumó**

Población de referencia: personas que fuman todos los días

o han fumado alguna vez todos los días durante un mes o más

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

<b>Edad</b>	<b>Porcentaje</b>
Menos de 16	3,9
16-18	15,0
19-21	17,2
22-30	23,0
30-39	19,7
40-49	13,2
50-59	4,9
60	1,4
<b>Valor medio</b>	<b>28,4</b>
<b>desvío</b>	<b>11,1</b>

Las distribuciones que refieren a prevalencia según sexo muestran un consumo mayor en el varón que se mantiene también en la población de 12 a 15 años. En este último grupo de edad (ref. Cap II) el uso de tabaco alguna vez en la vida alcanza al 27,34% mientras que en los últimos 30 días llega al 16,22%. (Ref. cap III).

#### **Tabaco en los últimos 30 días.**

Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999

<b>Sustancia</b>	<b>Masculino</b>	<b>Femenino</b>	<b>Total</b>
Tabaco	20,14	12,60	<b>16,22</b>

En el mes anterior a la encuesta, el promedio de cigarrillos diarios, de las personas de 16 a 64 años que fuman diariamente, fue de 13,5. (Ref. cap III). Sin embargo cuando se considera el período de mayor consumo la cantidad asciende a 21,7 cigarrillos diarios. (Ref. cap. III). Esta medida de mayor consumo fue considerada en este estudio como punto de referencia para efectuar el primer corte operativo que separara, por cantidad, al abuso de tabaco. (Ref. cap IV)

**Promedio de cigarrillos fumados en los últimos 30 días  
en personas que fuman diariamente.**

Población de referencia: personas que han fumado en los últimos 30 días

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

	Masc.	Fem.	16-24	25-34	35-49	50-64	Nes bajo	Nes medio	Nes alto	NBI si	NBI no
Val.	15,0	11,4	11,1	13,5	14,3	16,0	13,5	13,6	13,1	13,0	13,6
Med											
Des	11,3	8,2	8,7	9,7	11,3	10,6	9,9	11,1	9,8	11,4	10,0

**Promedio de cigarrillos fumados en el período que más fumó**

Población de referencia: personas que fuman todos los días

o han fumado alguna vez todos los días durante un mes o más.

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

	Masc.	Fem.	16-24	25-34	35-49	50-64	Nes bajo	Nes medio	Nes alto	NBI si	NBI no
Val.	24,3	18,1	18,5	22,4	22,3	23,4	22,6	19,9	22,6	21,8	21,7
Med											
Des	16,3	13,0	12,0	15,5	15,8	16,8	16,1	14,0	13,6	16,2	15,2

De esta forma, el abuso se midió tentativamente a partir de un corte por encima de los 20 cigarrillos diarios que incluyó al 12,83% de la población de 16 a 64 años. En los varones de este grupo este porcentaje alcanza el 17,30% mientras que en las mujeres queda en el 8,67%.

### **Abuso de tabaco en los últimos 30 días**

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Abuso	Sexo		TOTAL
	varón	mujer	
Tabaco(30d)	17,30	8,67	12,83

El síndrome de dependencia al tabaco representa al 26% de la población de 16 a 64 años que fumó en el último año (En la población total de 16 a 64 años de edad es de 14,0%). Es, por otra parte, uno de los casos donde el síndrome de dependencia es mayor en las mujeres con 27,53%. (Ref.Cap. IV).

### **Síndrome de dependencia al tabaco.**

Porcentaje sobre el total de personas que fumaron en el último año

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Dependencia al	varón	mujer	TOTAL
Tabaco	24,74	27,53	26,01

### Consumo de drogas ilegales

Los datos del estudio señalan que la prevalencia de vida del consumo de sustancias ilegales alcanza al 10,09% de la población de 16 a 64 años. (Ref. Cap. I ). Es decir, uno de cada diez argentinos que tiene entre 16 y 64 años consumió alguna vez en su vida una sustancia ilegal como Marihuana, Clorhidrato de cocaína, Sustancias inhalables, Alucinógenos, Pasta base, Opiáceos-Anestésicos o Crack.

### Consumo de "Drogas ilegales" según sexo.

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Prevalencia	Masc	Fem	Total
<b>30 días</b>	4,59	1,36	<b>2,92</b>
<b>Último año</b>	6,91	2,04	<b>4,39</b>
<b>Ex consumo</b>	9,65	5,04	<b>7,26</b>
<b>De vida o global</b>	13,95	6,49	<b>10,09</b>

La prevalencia de alguna vez en la vida, en los consumidores varones con un porcentaje ponderado de 13,95% duplica al de mujeres que alcanzan el 6,49%.

Por otra parte tomando como punto de partida los 30 días anteriores a la encuesta un 2,92% consumió alguna sustancia ilegal. (Ref. Cap. I ). Es decir que, aproximadamente, tres de cada 100 argentinos de 16 a 64 años habían consumido alguna droga durante el mes anterior al estudio.

### Consumo de drogas ilegales en la vida.

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Masc.	Fem.	Total
13,95	6,49	<b>10,09</b>

### **Consumo de drogas ilegales en los últimos 30 días.**

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Masc.	Fem.	Total
4,59	1,36	<b>2,92</b>

El análisis de la prevalencia en el grupo de 12 a 15 años indica que la prevalencia de vida alcanza al 3,63% mientras que la prevalencia de los últimos 30 días llega a 1,24% de ese grupo. En estas edades no hay diferencias significativas entre los porcentajes totales de ambos sexos (Ref. Cap.II).

### **Consumo de drogas ilegales en la vida .**

Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999

Sustancia	Masculino	Femenino	Total
Total Drogas ilegales	3,69	3,57	3,63

### **Consumo de drogas ilegales en los últimos 30 días**

Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999

Sustancia	Masculino	Femenino	Total
Total Drogas ilegales	1,24	1,25	1,24

### **Marihuana**

La marihuana es la sustancia más extendida dentro de las drogas ilegales. En el grupo de edad que comprende a los que están entre los 16 y 64 años alcanza una prevalencia de vida del 8,57%.

En este grupo los varones llegan a una proporción que involucra a más de un varón de cada diez. (Ref. Cap I). Los datos muestran que la prevalencia de vida en este grupo es más del doble de la que corresponde a las mujeres. Sin embargo la proporción por género se invierte cuando se la examina para el grupo de edad de 12 a 15 años. Sobre una prevalencia de vida total de 2,70% las jóvenes alcanzan el 3,57% contra el 1,76% de los varones.

### **Prevalencia de vida en el consumo de marihuana.**

Valores ponderados.

Población **16-64** años. Argentina 1999

Sustancia	Masc.	Fem.	Total
Marihuana	11,98	5,40	8,57

### **Prevalencia de vida en el consumo de marihuana.**

Valores ponderados.

Población **12-15** años. Argentina 1999

Sustancia	Masc.	Fem.	Total
Marihuana	1,76	3,57	2,70

Este cambio en la extensión del consumo de marihuana por sexo según el grupo de edad que se trate se presenta también en los últimos 30 días. La población de varones de 16 a 64 años que cuadriplica el consumo de las mujeres, en el grupo de 12 a 15 años es prácticamente igual.

### **Prevalencia del consumo de marihuana en los últimos 30 días.**

Valores ponderados. Población **16-64** años. Argentina 1999

Sustancia	Masc.	Fem.	Total
Marihuana	3,61	0,90	2,21

### **Prevalencia del consumo de marihuana en los últimos 30 días.**

Valores ponderados. Población **12-15** años. Argentina. 1999



Sustancia	Masc.	Fem.	Total
Marihuana	1,24	1,25	1,24

Se distingue en la población de 16 a 64 años que probó marihuana el mayor peso de los varones, de los grupos más jóvenes y una tendencia que ubica el consumo en los sectores de niveles socioeconómicos medios y altos (Ref.Cap.III) Relación que experimenta variaciones sin embargo en su análisis por NBI al tratarse de un agrupamiento más polarizado en materia social.

### Características del grupo que probó marihuana

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Masc.	Fem.	16-24	25-34	35-49	50-64	Nes bajo	Nes medio	Nes alto	NBI Sí	NBI No
12,0	4,9	13,4	12,7	6,4	0,7	7,0	10,3	11,5	9,9	8,1

La incidencia en el uso de marihuana medida como el uso producido por primera vez en los últimos 12 meses anteriores al momento de la encuesta alcanza al 9,5% de todos los que alguna vez usaron marihuana. El mayor porcentaje de casos nuevos entre los que probaron se encuentra en la población de mujeres.

### Incidencia del consumo de marihuana en los últimos 12 meses

Población de referencia: personas que usaron marihuana

por primera vez hace menos de un año

Valores ponderados. Población **16-64** años. Argentina 1999.

Incidencia	varón	mujer	TOTAL
Marihuana	8,6	11,5	9,5

El uso no experimental de marihuana es una construcción operativa originada en la frecuencia de consumo mayor a cinco veces en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días(Ref.Cap.IV). El 1,95% del total de personas de 16 a 64 años consumió marihuana con esta frecuencia en los últimos 12 meses y el 0,82% lo hizo así en los últimos 30 días

### Uso no experimental de marihuana en los últimos 12 meses.

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Abuso	Sexo		TOTAL
	varón	mujer	
Marihuana(12m)	2,99	0,98	1,95

### Uso no experimental de marihuana en los últimos 30 días.

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Abuso	Sexo		TOTAL
	varón	mujer	
Marihuana(30d)	1,39	0,29	0,82

Se distingue en la población de 16 a 64 años con uso no experimental de marihuana en los últimos 30 días un porcentaje similar por sexo (a diferencia del grupo total que probó marihuana), se acentúa la presencia de los grupos más jóvenes (no hay casos de consumo no experimental después de los 50 años) y una tendencia que ubica (a diferencia del grupo total que probó) el consumo predominantemente en los sectores de niveles socioeconómicos bajos y altos, situación que cambia al llevar el análisis a NBI con situaciones más extremas. (ref.Cap. III )

### Características de la población con uso no experimental de marihuana en los últimos 30 días

Población de referencia: personas que probaron marihuana

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Masc.	Fem.	16-24	25-34	35-49	50-65	Nes bajo	Nes medio	Nes alto	NBI sí	NBI no
11,9	11,0	19,9	7,6	4,4	0,0	14,4	7,2	13,2	15,4	10,7

El 23,28% del total de personas que fumaron marihuana en los últimos doce meses pueden ubicarse por sus respuestas dentro del síndrome de dependencia según las pautas del CIE10(Ref. inicio). (En la población total de 16 a 64 años es de 1,24%.)

La dependencia a la marihuana en la población femenina, que fumó en los últimos doce meses, duplica a la que presentan los varones (Ref. Cap. IV) y tiende a ubicarse en las grupos de edades más jóvenes.

### Síndrome de dependencia a la marihuana.

Porcentaje sobre total de personas que fumaron marihuana en los últimos doce meses

Valores ponderados. Población **16-64 años**. Argentina 1999

Dependencia	varón	mujer	TOTAL
Marihuana	18,62	37,02	23,28

### Síndrome de dependencia a la marihuana.

Porcentaje sobre total de personas que fumaron marihuana en el último año

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Dependencia	16-24	25-34	35-49	50-64	TOTAL
Varon	20,48	17,67	16,35		18,62
mujer	35,81	42,14			37,02
TOTAL	25,72	22,47	16,35		23,28

### Clorhidrato de cocaína.

La cocaína en la Argentina, como en Centro y Sudamérica, es la sustancia emblemática del grupo de drogas ilícitas. Ha despertado acciones de naturaleza muy diversa que, buscando terminar con su producción y consumo,

la han instalado en la percepción social como el eje dominante sobre el que se discuten los problemas de drogadicción y el narcotráfico.

Los datos del estudio nacional señalan que en el grupo de edad de 16 a 64 años alcanza una prevalencia de vida de 3,69% .En este grupo los varones llegan a una proporción que involucra a mas de un varón de cada veinte. (Ref. Cap I ). Los datos muestran que la prevalencia de vida en este grupo es más del triple de la que corresponde a las mujeres. En el grupo de 12 a 15 años la prevalencia de vida es de 0,59 % y no hay casos de consumo femenino en este grupo.

### **Prevalencia de vida en el consumo de clorhidrato de cocaína.**

Valores ponderados. Población **16-64** años. Argentina 1999

Sustancia	Masc.	Fem.	Total
Clorhidrato de cocaína	5,82	1,69	<b>3,69</b>

### **Prevalencia de vida en el consumo de clorhidrato de cocaína.**

Valores ponderados. Población **12-15** años. Argentina. 1999

Sustancia	Masc.	Fem.	Total
Clorhidrato de cocaína	1,24		<b>0,59</b>

La prevalencia del consumo de cocaína en los últimos 30 días aparece en el 1,25% de la población de 16 a 64 años mientras que en el grupo de 12 a 15 años es de 0,53%. De forma semejante a la prevalencia de vida el consumo de cocaína se concentra en los varones.

### **Prevalencia del consumo de clorhidrato de cocaína en los últimos 30 días.**

Valores ponderados. Población **16-64** años. Argentina 1999

Sustancia	Masculino	Femenino	Total
Clorhidrato de cocaína	1,98	0,56	<b>1,25</b>

**Prevalencia del consumo de clorhidrato de cocaína  
en los últimos 30 días.**

Valores ponderados. Población 12-15 años. Argentina. 1999

Sustancia	Masculino	Femenino	Total
Clorhidrato de cocaína	1,10		<b>0,53</b>

Se distingue en la población de 16 a 64 años que probó cocaína el mayor peso de los varones, de los grupos más jóvenes (particularmente por debajo de los 35 años) y una tendencia que ubica el consumo en los sectores de niveles socioeconómicos medios y bajos. Si en el análisis se incluye los grupos caracterizados por las Necesidades Básicas Insatisfechas que agrupan a sectores mas carenciados que los que recoge el NES "bajo" esta tendencia se profundiza.

**Prueba de cocaína**

Población de referencia: Total de personas

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Masc.	Fem.	16-24	25-34	35-49	50-64	Nes bajo	Nes medio	Nes alto	NBI si	NBI no
6,2	1,4	6,9	5,9	1,8	0,5	3,9	3,6	3,1	6,3	3,3

La incidencia o uso por primera vez de cocaína en los últimos 12 meses, medida dentro del grupo de consumidores, alcanza al 6,4% de todos los que

alguna vez usaron cocaína. El mayor porcentaje de casos nuevos entre los que probaron se encuentra en la población de mujeres.

### **Incidencia del consumo de clorhidrato de cocaína por primera vez en los últimos 12 meses, según sexo**

Población de referencia: personas que usaron clorhidrato de cocaína

por primera vez hace menos de un año

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999.

Incidencia	varón	mujer	TOTAL
Clorhidrato de cocaína	3,4	19,2	6,4

El estudio no registra casos de incidencia en los últimos 30 días.

El uso no experimental de cocaína, de la misma manera que en el resto de las sustancias ilícitas, es una construcción operativa originada en la frecuencia de consumo mayor a cinco veces en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días. (Ref. Cap.IV). Con este criterio se halló que el 1,08% del total de personas de 16 a 64 años consumió cocaína con esta frecuencia y el 0,46% lo hizo en los últimos 30 días

### **Uso no experimental de clorhidrato de cocaína en los últimos 12 meses**

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999.

Abuso	Sexo		TOTAL
	varón	mujer	
Clorhidrato de cocaína(12m)	1,78	0,42	1,08

### **Uso no experimental de clorhidrato de cocaína en los últimos 30 días**

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999.

Abuso	Sexo		TOTAL
	varón	mujer	
Clorhidrato de cocaína(30d)	0,89	0,06	0,46

Se distingue en la población de 16 a 64 años con uso no experimental de cocaína en los últimos 30 días un porcentaje similar por sexo, es clara la predominancia en los grupos más jóvenes (en particular el grupo de 16 a 24 años ) y la ubicación del problema en los dos sectores socioeconómicos extremos bajo y alto. Sin embargo el análisis llevado por NB que polariza más los grupos sociales muestra un importante acento en los sectores con NBI. (Ref. Cap.III)

### Características de la población con uso no experimental de cocaína en los últimos 30 días

Población de referencia: personas que alguna vez probaron cocaína

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Masc.	Fem.	16-24	25-34	35-49	50-64	Nes bajo	Nes medio	Nes alto	NBI si	NBI no
13,7	13,1	20,7	10,0	2,4	0,0	17,4	0,0	34,0	26,7	8,7

El 46,98% del total de personas que usaron cocaína en los últimos doce meses pueden ubicarse por sus respuestas dentro del síndrome de dependencia según las pautas del CIE10 (Ref. inicio). ( En la población total de 16 a 64 años es de 1,31% - Ref. Cap IV ). La dependencia a la cocaína en la población femenina, que tomó en los últimos doce meses, es equivalente a la que presentan los varones y tiende a ubicarse en los grupos de edades medias entre los 25 y los 34 años.

### Síndrome de dependencia a la cocaína según sexo

Porcentaje sobre total de personas que tomaron cocaína en los últimos 12 meses

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Dependencia	varón	mujer	TOTAL
Clorhidrato de cocaína	46,26	49,36	46,98

### Síndrome de dependencia a la cocaína según edad.

Porcentaje sobre total de personas que tomaron cocaína en el último año

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Dependencia Clorhidrato de cocaína	16-24	25-34	35-49	50-64	TOTAL
varón	47,37	69,98	24,76		46,26
mujer	43,65	65,99			49,36
TOTAL	46,28	68,85	24,76		46,98

### Sustancias inhalables.

Las sustancias inhalables alcanzan, en el grupo de edad que comprende a los que están entre los 16 y 64 años, una prevalencia de vida del 1,82% .En este grupo los varones tienen una proporción mayor de casos (2,33% ) con relación a la población femenina del mismo grupo (1,34%). (Ref. Cap I ). Los resultados son similares para el grupo de edad de 12 a 15 años donde, sobre una prevalencia de vida total de 1,87%, los varones alcanzan el 2,28% contra el 1,49% de las mujeres.

### Prevalencia de vida en el consumo de sustancias inhalables.

Valores ponderados. Población **16-64** años. Argentina 1999

Sustancia	Masc.	Fem.	Total
Sustancias inhalables	2,33	1,34	1,82

### Prevalencia de vida en el consumo de sustancias inhalables.

Valores ponderados. Población **12-15** años. Argentina. 1999

Sustancia	Masc.	Fem.	Total
Sustancias inhalables	2,28	1,49	1,87



La prevalencia del consumo de sustancias inhalables medida en los últimos 30 días mantiene la proporción más acentuada en los varones en la población de 12 a 64 años para invertirse en la de 12 a 15 años. En este grupo la prevalencia es también mayor con relación al grupo de mayor edad (Ref.Cap.I)

### **Prevalencia del consumo de sustancias inhalables en los últimos 30 días.**

Valores ponderados. Población **16-64** años. Argentina 1999

<b>Sustancia</b>	<b>Masc.</b>	<b>Fem.</b>	<b>Total</b>
Sustancias inhalables	0,63	0,14	<b>0,38</b>

### **Prevalencia del consumo de sustancias inhalables en los últimos 30 días.**

Valores ponderados. Población **12-15** años. Argentina. 1999

<b>Sustancia</b>	<b>Masc.</b>	<b>Fem.</b>	<b>Total</b>
Sustancias inhalables	0,35	1,25	<b>0,82</b>

Se observa en la población de 16 a 64 años que probó sustancias inhalables el mayor peso de los varones, de los grupos más jóvenes (particularmente entre los 16 y 24 años) y una tendencia que ubica el consumo en los sectores de niveles socioeconómicos bajos. El análisis desde esta última relación por Necesidades Básicas Insatisfechas muestra que esta tendencia se profundiza (Ref.Cap.III)

### **Prueba de sustancias inhalables.**

Población de referencia: Total de personas

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Masc.	Fem.	16-24	25-34	35-49	50-64	Nes bajo	Nes medio	Nes alto	NBI si	NBI no
2,8	1,1	4,3	2,6	0,6	0,4	2,5	1,1	0,6	3,9	1,5

La incidencia o uso por primera vez de sustancias inhalables en los últimos 12 meses, medida dentro del grupo de inhaladores, alcanza al 6,8%. El mayor porcentaje de casos nuevos entre los que probaron se encuentra en la población de varones.

### **Incidencia del consumo de sustancias inhalables en los últimos 12 meses**

Población de referencia: personas que usaron sustancias inhalables

por primera vez hace menos de un año

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999.

Incidencia	varón	mujer	TOTAL
Sustancias inhalables	8,7	2,4	6,8

El uso no experimental (consumo mayor a cinco veces) de sustancias inhalables en los últimos 12 meses es de 0,25% en el grupo de 16 a 64. En los últimos 30 días (Ref. Cap.IV) se presenta en el 0,09% .

### **Uso no experimental de sustancias inhalables en los últimos 12 meses, según sexo**

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999.

Abuso	Sexo		TOTAL
	varón	mujer	
Sustancias inhalables(12m)	0,53		0,25

### **Uso no experimental de sustancias inhalables en los últimos 30 días**

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999.

Abuso	Sexo		TOTAL
	varón	mujer	
Sustancias inhalables(30d)	0,19		0,09

*El grupo de personas con inhalación no experimental en los últimos 30 días no tiene suficiente cantidad de casos para permitir un análisis de su perfil según distintas variables.*

El 13,62% del total de personas que usaron sustancias inhalables en los últimos doce meses pueden ubicarse por sus respuestas dentro del síndrome de dependencia según las pautas del CIE10 (Ref. inicio). No hay casos en la población femenina que abarcó el estudio. (En la población total de 16 a 64 años el síndrome de dependencia es de 0,13%. Ref. Cap. IV)

### **Síndrome de dependencia a las sustancias inhalables**

Porcentaje sobre total de personas que usaron sustancias inhalables

en el último año

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Dependencia	varón	mujer	TOTAL
Sustancias inhalables	18,43		13,62

### **Sustancias alucinógenas**

Las sustancias alucinógenas alcanzan, en el grupo de edad que comprende a los que están entre los 16 y 64 años, una prevalencia de vida del 1,57% .En este grupo los varones tienen una proporción mayor de casos (2,78% ) con relación a la población femenina del mismo grupo (0,45%). (Ref. Cap I ). En la población abarcada por la muestra del estudio no se hallaron casos de consumo de sustancias alucinógenas en el grupo de edad ubicado entre los 12 y los 15 años.

### **Prevalencia de vida en el consumo de alucinógenos.**

Valores ponderados. Población **16-64** años. Argentina 1999

Sustancia	Masc.	Fem.	Total
Alucinógenas	2,78	0,45	1,57

### **Prevalencia del consumo de alucinógenos en los últimos 30 días.**

Valores ponderados. Población **16-64** años. Argentina 1999

Sustancia	Masc.	Fem.	Total
-----------	-------	------	-------

Alucinógenas	0,41		0,20
--------------	------	--	------

En la población que probó sustancias alucinógenas predominan los varones, los grupos más jóvenes (particularmente por debajo de los 25 años) y una tendencia que ubica el consumo en los sectores de niveles socioeconómicos medios y bajos. Si en el análisis se incluye los grupos caracterizados por las Necesidades Básicas Insatisfechas que agrupan a sectores más carenciados que los que recoge el NES bajo esta tendencia se profundiza (Ref.cap.III)

### Prueba de sustancias alucinógenas.

Población de referencia: personas a quienes alguna vez les ofrecieron alucinógenos

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Masc.	Fem.	16-24	25-34	35-49	50-64	Nes bajo	Nes medio	Nes alto	NBI si	NBI no
1,2	0,2	0,6	0,6	0,4	0,0	0,7	0,4	0,2	0,2	1,2

La incidencia o uso por primera vez de sustancias alucinógenas en los últimos 12 meses, medida dentro del grupo de consumidores, alcanza al 6,0% de todos los que alguna vez usaron alucinógenos. El mayor porcentaje de casos nuevos entre los que probaron se encuentra en la población de mujeres.

### Consumo de alucinógenos por primera vez en los últimos 12 meses.

Población de referencia: personas que usaron alucinógenos por primera vez hace menos de un año

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999.

Incidencia	varón	mujer	TOTAL
Alucinógenos	5,6	8,7	6,0

El uso no experimental (consumo mayor a cinco veces) de sustancias alucinógenas en los últimos 12 meses es de 0,09% en el grupo de 16 a 64. En los últimos 30 días (Ref. Cap.IV) se presenta en el 0,01% .

### Uso no experimental de alucinógenos

en los últimos 12 meses

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999.

Abuso	Sexo		TOTAL
	varón	mujer	
Alucinógenos	0,19		0,09

### **Uso no experimental de alucinógenos en los últimos 30 días**

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999.

Abuso	Sexo		TOTAL
	varón	mujer	
Alucinógenos	0,02		0,01

El 10,92% del total de personas que usaron sustancias alucinógenas en los últimos doce meses pueden ubicarse por sus respuestas dentro del síndrome de dependencia según las pautas del CIE10 (Ref. inicio). (En la población total de 16 a 64 años es de 0,17%. Ref.Cap.IV) No hay casos de síndrome de dependencia en la población femenina.

### **Síndrome de dependencia a los alucinógenos**

Porcentaje sobre total de personas que usaron alucinógenos en el último año

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Dependencia	varón	mujer	TOTAL
Alucinógenos	11,73		10,92

### **Pasta Base**

El uso de Pasta base alcanza, en el grupo de edad que comprende a los que están entre los 16 y 64 años, una prevalencia de vida del 0,88% .En este grupo los varones tienen una proporción mayor de casos (1,45% ) con relación a la

población femenina del mismo grupo (0,36%). (Ref. Cap I ). En la población abarcada por la muestra del estudio no se hallaron casos de consumo de sustancias inhalables en el grupo de edad ubicado entre los 12 y los 15 años.

### **Prevalencia de consumo de pasta base en la vida .**

Valores ponderados. Población **16-64** años. Argentina 1999

<b>Sustancia</b>	<b>Masc.</b>	<b>Fem.</b>	<b>Total</b>
<b>Pasta base</b>	1,45	0,36	<b>0,88</b>

### **Prevalencia de consumo de pasta base en los últimos 30 días.**

Valores ponderados. Población **16-64** años. Argentina 1999

<b>Sustancia</b>	<b>Masc.</b>	<b>Fem.</b>	<b>Total</b>
<b>Pasta base</b>	0,60	0,03	<b>0,30</b>

En la población que probó pasta base predominan los varones, los grupos más jóvenes (particularmente por debajo de los 35 años) y una tendencia que ubica el consumo en los sectores de niveles socioeconómicos bajos. Si en el análisis se incluye los grupos caracterizados por las Necesidades Básicas Insatisfechas que agrupan a sectores mas carenciados que los que recoge el NES bajo, esta tendencia se profundiza(Ref.Cap.III).

### **Prueba de pasta base.**

Población de referencia: Total de personas

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Masc.	Fem.	16-24	25-34	35-49	50-64	Nes bajo	Nes medio	Nes alto	NBI si	NBI no
1,3	0,4	1,5	1,5	0,3	0,0	1,0	0,4	0,6	1,2	0,7

La incidencia o uso por primera vez de pasta base en los últimos 12 meses, medida dentro del grupo de consumidores, alcanza al 10,5% de todos los que alguna vez usaron pasta base.

### **Incidencia del consumo de pasta base por primera vez en los últimos 12 meses, según sexo**

Población de referencia: personas que usaron pasta base

por primera vez hace menos de un año

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999.

Incidencia	varón	mujer	TOTAL
Pasta Base	13,5	0,0	10,5

El uso no experimental (consumo mayor a cinco veces) de pasta base en los últimos 12 meses es de 0,27% en el grupo de 16 a 64. En los últimos 30 días (Ref. Cap.IV) se presenta en el 0,15% .

### **Uso no experimental de pasta base en los últimos 12 meses**

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999.

Pasta base	varón	mujer	TOTAL
Uso no experimental	0,52	0,03	0,27

### **Uso no experimental de pasta base en los últimos 30 días**

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999.

Pasta base	varón	mujer	TOTAL
Uso no experimental	0,29	0,03	0,15

El 54,93% del total de personas que usaron pasta base en los últimos doce meses pueden ubicarse por sus respuestas dentro del síndrome de dependencia según las pautas del CIE10 (Ref. inicio). El total de las mujeres que usaron pasta base experimentaron síntomas del síndrome de dependencia (Ref.Cap.IV)

(En la población total de 16 a 64 años el síndrome de dependencia a la Pasta Base es de 0,34%. Ref.Cap.IV)

### **Síndrome de dependencia a la Pasta Base.**

Porcentaje sobre total de personas que tomaron Pasta Base en el último año

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Dependencia	varón	mujer	TOTAL
Pasta Base	53,09	100,0	54,93

### **Opiáceos y Anestésicos**

El uso de opiáceos y anestésicos alcanza, en el grupo de edad que comprende a los que están entre los 16 y 64 años, una prevalencia de vida del 0,55% .En este grupo los varones tienen una proporción mayor de casos (0,99% ) con relación a la población femenina del mismo grupo (0,15%).En el período que toma el consumo en los últimos 30 días la prevalencia para este grupo es de 0,14%. (Ref. Cap I).En el grupo de edad ubicado entre los 12 y 15 años se registró un 0,05% de casos con consumo en la vida (Ref.Cap.II)

### **Prevalencia de vida en el consumo de opiáceos y anestésicos.**

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999



Sustancia	Masculino	Femenino	Total
Opiáceos y anestésicos	0,99	0,15	<b>0,55</b>

### Consumo de opiáceos y anestésicos en la vida.

Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999

Sustancia	Masculino	Femenino	Total
Opiáceos y anestésicos	0,11		<b>0,05</b>

### Prevalencia del consumo de opiáceos y anestésicos en los últimos 30 días.

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Sustancia	Masculino	Femenino	Total
Opiáceos y anestésicos	0,29		<b>0,14</b>

En la población que probó opiáceos y anestésicos predominan los varones, los grupos más jóvenes (particularmente por debajo de los 25 años) y una tendencia que ubica el consumo en los sectores de niveles socioeconómicos altos (Ref.Cap.III)

### Prueba de opiáceos o anestésicos

Población de referencia: Total de personas

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Masc.	Fem.	16-24	25-34	35-49	50-64	Nes bajo	Nes medio	Nes alto	NBI si	NBI no
2,1	0,8	2,1	1,8	1,0	0,8	1,3	1,4	2,8	1,7	1,4

La incidencia o uso por primera vez de opiáceos o anestésicos en los últimos 12 meses, medida dentro del grupo de consumidores, alcanza al 3,1% de todos los que alguna vez usaron opiáceos o anestésicos.

### **Consumo de opiáceos o anestésicos por primera vez en los últimos 12 meses, según sexo**

Población de referencia: personas que usaron opiáceos o anestésicos

sin indicación médica por primera vez hace menos de un año

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999.

Incidencia	varón	mujer	TOTAL
Opiáceos o anestésicos	3,6	0,0	3,1

El abuso (consumo mayor a cinco veces) de opiáceos o anestésicos en los últimos 12 meses es de 0,06% en el grupo de 16 a 64. En los últimos 30 días (Ref. Cap.IV) se presenta en el 0,01% (Ref.Cap.IV)

### **Abuso de opiáceos y anestésicos en los últimos 12 meses.**

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999.

Abuso	Sexo		TOTAL
	varón	mujer	
Opiáceos y anestésicos(12m)	0,13		0,06

### **Abuso de opiáceos y anestésicos en los últimos 30 días.**

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999.

Abuso	Sexo		TOTAL
	varón	mujer	
Opiáceos y anestésicos(30d)	0,02		0,01

El 43,86% del total de personas (Ref.Cap.IV) que usaron opiáceos o anestésicos en los últimos doce meses pueden ubicarse por sus respuestas

dentro del síndrome de dependencia según las pautas del CIE10 (Ref. Apéndice). (En la población total de 16 a 64 años es de 0,22%. Ref.Cap.IV)

### **Síndrome de dependencia a los opiáceos y anestésicos**

Porcentaje sobre total de personas que tomaron opiáceos y anestésicos en el último año

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Dependencia	varón	mujer	TOTAL
Opiáceos y Anestésicos	43,86		43,86

### **Crack**

El uso de Crack alcanza, en el grupo de edad que comprende a los que están entre los 16 y 64 años, una prevalencia de vida del 0,31% .En este grupo los varones tienen una proporción mayor de casos (0,45% ) con relación a la población femenina del mismo grupo (0,18%). (Ref. Cap I ). La población situada entre los 12 y 15 años no presentaron casos de consumo.

#### **Prevalencia de vida en el consumo de Crack.**

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Sustancia	Masculino	Femenino	Total
Crack	0,45	0,18	<b>0,31</b>

#### **Prevalencia en los últimos 30 días del consumo de crack.**

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Sustancia	Masculino	Femenino	Total
Crack	0,30		<b>0,15</b>

Los datos recogidos por la muestra son insuficientes en este caso para el examen de características sociodemográficas de los que consumieron crack.

La incidencia o uso por primera vez de crack en los últimos 12 meses, medida dentro del grupo de consumidores, alcanza al 25,6% de todos los que alguna vez usaron crack.

### **Incidencia del consumo de crack por primera vez en los últimos 12 meses**

Población de referencia: personas que usaron crack

por primera vez hace menos de un año

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999.

Incidencia	varón	mujer	TOTAL
Crack	20,7	38,2	25,6

El consumo no experimental (consumo mayor a cinco veces) de crack en los últimos 12 meses es de 0,04% en el grupo de 16 a 64. En los últimos 30 días (Ref. Cap.IV) se presenta en el 0,01% .

### **Uso no experimental de crack en los últimos 12 meses**

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999.

Abuso	varón	mujer	TOTAL
Crack	0,08		0,04

### **Uso no experimental de crack en los últimos 30 días**

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999.

Abuso	varón	mujer	TOTAL
Crack	0,02		0,01

El 6,03% del total de personas que usaron crack (Ref. Cap.IV) en los últimos doce meses pueden ubicarse por sus respuestas dentro del síndrome de dependencia según las pautas del CIE10 (Ref. inicio). (En la población total de 16 a 64 años es de 0,06%. Ref.Cap.IV)

### **Síndrome de dependencia al Crack**

Porcentaje sobre total de personas que usaron crack en el último año

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Dependencia	varón	mujer	TOTAL
Crak	6,58		6,03

### **Consumo de Medicamentos con uso ilícito**

La utilización de psicotrópicos fuera de prescripción médica configura parte del problema del abuso de sustancias psicoactivas. Dentro de estas se ha encontrado no sólo el uso de una medicación más allá del período indicado por el médico o con un propósito de aliviar problemas como la tensión o el insomnio sino también la búsqueda de alteración de la conciencia que faciliten comportamientos o prácticas o bien como paliativos de efectos de otras drogas.

La prevalencia de vida en el uso ilícito de medicamentos alcanza al 4,36% del grupo de 16 a 64 años de edad. El mayor porcentaje se ubica dentro de los sedantes con 6,05% y, dentro de éste grupo, las mujeres consumidoras se ubican en un porcentaje superior a los varones con 6,58%.

El uso de estimulantes llega a una prevalencia de vida de 2,85% y, dentro de este grupo, el grupo de varones presenta una prevalencia de vida que duplica con 3,87% el correspondiente al grupo de mujeres (Ref.Cap.I).

### **Prevalencia de vida en el consumo de medicamentos con uso ilícito.**

Valores ponderados. Población **16-64** años. Argentina 1999

Sustancia	Masc.	Fem.	Total
Sedantes	5,48	6,58	6,05
Estimulantes	3,87	1,90	2,85
<b>TOTAL Medicamentos con uso ilícito</b>	<b>2,99</b>	<b>5,64</b>	<b>4,36</b>

En el caso del uso de sedantes fuera de prescripción médica el promedio de edad se ubica sobre los 27 años. En el uso de estimulantes se ubica en una edad promedio menor cercana a los veinte años (Ref. Cap. III ). Varones y mujeres comparten tasas semejantes de abuso.

**Promedio de edad del consumo de medicamentos sedantes  
sin indicación médica**

Población de referencia: personas que alguna vez tomaron sedantes

sin indicación médica o en mayor cantidad

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

	Total	Masc.	Fem.	16-24	25-34	35-49	50-64	Nes bajo	Nes medio	Nes alto	NBI si	NBI no
Promed	27,3	26,9	27,6	17,8	22,2	31,3	39,5	26,9	26,7	30,3	29,0	26,9
Desvío	10,6	10,8	10,3	2,1	4,7	8,6	10,3	10,8	10,2	9,7	10,4	10,6

**Promedio de edad del consumo de medicamentos estimulantes  
sin indicación médica.**

Población de referencia: personas que alguna vez tomaron estimulantes

sin indicación médica o en mayor cantidad

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

	Total	Masc.	Fem.	16-24	25-34	35-49	50-64	Nes bajo	Nes medio	Nes alto	NBI si	NBI no
Promed	20,0	20,7	18,6	17,7	21,7	18,7	21,1	19,8	20,2	19,8	20,1	19,9
Desvío	4,4	4,2	4,4	2,5	3,3	3,0	5,9	4,5	4,0	4,9	4,8	4,3

La prevalencia del uso ilícito de medicamentos, medida para los últimos 30 días es de 1,21% para la población de 16 a 64 años (Ref. Cap. I ).

**Prevalencia del consumo de medicamentos con uso ilícito en los últimos 30 días.**

Valores ponderados. Población **16-64** años. Argentina 1999

Sustancia	Masc.	Fem.	Total
Sedantes	1,63	1,34	1,48
Estimulantes	0,84	0,28	0,55
<b>TOTAL Medicamentos con uso ilícito</b>	<b>1,10</b>	<b>1,32</b>	<b>1,21</b>

El abuso de estimulantes, circunscripto a los últimos 30 días anteriores a la encuesta, se presenta en grupos más jóvenes (menores de 25 años) a diferencia de los sedantes. A nivel de NBI tiene una mayor presencia, aún cuando en ambos, sedantes y estimulantes, tienden a situarse dentro de estas (ref. cap. III)

**Abuso de medicamentos sedantes o estimulantes  
mayor a cinco veces en los últimos 30 días**

Población de referencia: personas que alguna vez tomaron uno de estos

sin indicación médica o en mayor cantidad

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

	Total	Masc.	Fem.	16-24	25-34	35-49	50-65	Nes bajo	Nes medio	Nes alto	NBI si	NBI no
Sedantes	11,2	9,4	12,8	5,9	7,6	17,0	14,1	8,5	17,3	9,7	13,1	10,8
Estimulante	7,7	7,2	8,7	19,9	2,7	8,5	2,6	9,4	6,3	7,0	23,8	4,6

El total de menciones que surge de la pregunta abierta sobre nombres de sustancias estimulantes indica en un 45% a las anfetaminas y en un 15% al Tاملان. Un 31% no recuerda el nombre de la sustancia que utilizó con este propósito (Ref.Cap.III)

El Éxtasis (excluida de la tabulación de medicamentos) como sustancia ilícita aparece aproximadamente en el 1,3% del total de las menciones sobre sustancias buscadas como estimulantes (Ref. Cap. III ).

El 16,12% del total de personas que usaron medicamentos estimulantes (Ref. Cap.IV) en los últimos doce meses pueden ubicarse por sus respuestas dentro del síndrome de dependencia según las pautas del CIE10 (Ref. inicio). (En la población total de 16 a 64 años es de 0,62%. Ref.Cap.IV)

En el caso de los sedantes, el 17,66 % del total de personas que los usaron (Ref. Cap.IV) en los últimos doce meses, se puede ubicarse por sus respuestas dentro del síndrome de dependencia según las pautas del CIE10 (Ref. inicio). (En la población total de 16 a 64 años este porcentaje es de 0,97%. Ref.Cap.IV)

**Síndrome de dependencia a los estimulantes.**

Porcentaje sobre total de personas que tomaron estimulantes en los últimos 12 meses

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Dependencia	varon	mujer	TOTAL
Estimulantes	14,78	21,49	16,12



## Síndrome de dependencia a los sedantes.

Porcentaje sobre total de personas que tomaron sedantes en los últimos 12 meses

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999

Dependencia	varon	mujer	TOTAL
Sedantes	17,61	17,71	17,66

En el grupo de 12 a 15 años de edad la prevalencia de vida en el uso ilícito de medicamentos alcanza al 2,60%. El mayor porcentaje se ubica dentro de los sedantes con 3,32% y, dentro de éste grupo, las mujeres consumidoras se ubican en un porcentaje superior a los varones con 5,05% (Ref.Cap.II).

El uso de estimulantes llega a una prevalencia de vida de 0,10% y, dentro de este grupo, solo se encuentra el grupo de varones con una prevalencia de vida de 0,21. La prevalencia para los últimos 30 días es de 0,15%.

## Consumo de medicamentos con uso ilícito en la vida.

Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999

Sustancia	Masculino	Femenino	Total
Sedantes	1,44	5,05	3,32
Estimulantes	0,21		0,10
Total Medicamentos con uso ilícito	1,30	3,80	2,60

## Consumo de medicamentos con uso ilícito en los últimos 30 días.

Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999

Sustancia	Masculino	Femenino	Total
Sedantes	0,32		0,15
Total Medicamentos con uso ilícito	0,32		0,15

La incidencia o uso por primera vez de estimulantes en los últimos 12 meses, medida dentro del grupo de consumidores, alcanza al 5,0% de todos los que

alguna vez usaron estos medicamentos fuera de prescripción médica. La incidencia de casos en los varones es de 7,8%.

### **Incidencia del consumo de estimulantes en los últimos 12 meses.**

Población de referencia: personas que usaron estimulantes por primera vez hace menos de un año

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999.

Incidencia	varón	mujer	TOTAL
Estimulantes	7,8	0,0	5,0

La incidencia o uso por primera vez de sedantes en los últimos 12 meses, medida dentro del grupo de consumidores, alcanza al 13,7% de todos los que alguna vez usaron estos medicamentos fuera de prescripción médica. La incidencia de casos en los varones es de 18,0% mientras que en las mujeres es de 10%.

### **Incidencia de consumo de sedantes en los últimos 12 meses.**

Población de referencia: personas que usaron sedantes por primera vez hace menos de un año

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999.

Incidencia	varón	mujer	TOTAL
Sedantes	18,0	10,0	13,7